



## LA LIVRÉE DES FORÊTS

Depuis les deux dernières années vous avez probablement remarqué la chenille de la livrée des forêts. Elle se déplace souvent en groupes impressionnant et peut rapidement dévorer les feuilles des peupliers, érables, bouleaux et autres feuillus. Si les attaques se répètent sur plusieurs années, l'arbre perd de la vigueur et peut devenir vulnérable aux maladies et insectes. Sur notre territoire, l'épidémie a débuté en 2017. Ce genre d'infestation ne dure en général pas plus de 3 à 4 ans.



Papillon de nuit

Cette chenille qui devient un papillon de nuit, a des prédateurs naturels tels les oiseaux, guêpes et fourmis. Vous avez peut-être aussi remarqué l'an dernier, la présence d'une quantité inhabituelle de grosses mouches qui ressemblent à la mouche domestique. Il s'agit probablement de la mouche sarcophage qui se manifeste normalement à la deuxième année d'infestations de la livrée des forêts. Ne la tuer pas, elle rend service en éliminant la chenille et disparaîtra une fois l'épidémie terminée.

Plusieurs méthodes naturelles existent pour protéger vos arbres de la livrée des forêts comme; retirer les colonies de chenilles des arbres, éliminer le plus de cocons possible, installer une bande collante autour du tronc (Tangle Foot). Pour tous les trucs et astuces, référez-vous à la fiche produite par le ministère des forêts, de la faune et des parcs du Québec sur notre site internet sous l'onglet « Service de l'urbanisme et de l'environnement », Livrée des forêts ».



Cocon jaunâtre

Liens internet vers le ministère des forêts, de la faune et des parcs du Québec (MFFP)

<https://mffp.gouv.qc.ca/forets/fimaq/insectes/fimaq-insectes-insectes-livree.jsp>

[http://www.afm.qc.ca/UTCF\\_MEDIA/ficheLivreedesforets\\_MFFP.pdf](http://www.afm.qc.ca/UTCF_MEDIA/ficheLivreedesforets_MFFP.pdf)